

Avant l'opération :

- * Éviter de prendre de l'aspirine dans les 10 jours qui précèdent l'intervention.
- * Rapporter vos radios si elles sont en votre possession.
- * Se procurer les produits et médicaments nécessaires aux soins post-opératoires.
- * Respecter les recommandations données lors de votre consultation d'anesthésie.



**Contacter votre chirurgien ou
votre anesthésiste en urgence
si :**


- * Persistance de la douleur.
- * Fièvre.
- * Persistance des nausées, vomissements.
- * Persistance des saignements.



Tel chirurgien : 02 62 96 26 38
Tel anesthésiste : 02 62 96 26 37

AVICENNE
CLINIQUE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE

LES DENTS DE SAGESSE



Service de chirurgie : 0262 42 41 66
De 06h à 18h du lundi au vendredi
De 06h à 15h le mercredi

CONSEILS APRES UNE CHIRURGIE DES DENTS DE SAGESSE

Les premiers jours, ne vous inquiétez pas si :

Ça saigne toujours un peu

Un petit saignement persiste pendant quelques heures (parfois la nuit qui suit).

Il y a des douleurs

La douleur est plus souvent présente en bas qu'en haut. Elle cède souvent avec les médicaments.

Il y a un gonflement

Le gonflement (œdème) est fréquent.

La bouche ne s'ouvre pas en grand


Une limitation de l'ouverture de bouche est fréquente pendant quelques jours bien qu'elle ne soit pas systématique.




Quelques conseils

Afin de favoriser une bonne cicatrisation, il est nécessaire de suivre ces consignes après l'intervention :

Alimentation molle, tiède ou froide



Éviter les épices, les aliments acides



Se brosser les dents après chaque repas



Stopper l'alcool et le tabac

SIGNES D'ALERTE EN CAS D'INFECTION

- * Une douleur souvent nocturne qui apparaît 3 semaines après l'intervention et qui résiste aux médicaments.
- * De la fièvre.

